

注解傷寒論卷第六

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨太陰病脉證并治法第十

太陰之爲病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛

若下之必胃下結

太陰爲病陽邪傳裏也太陰之脉布胃中邪氣壅而爲腹滿上

不得降者嘔吐而食不下不得上者自利益甚時

腹自痛陰寒在內而爲腹痛者則爲常痛此陽邪干裏雖痛而亦不常痛但時時腹自痛也若下之則陰邪留於胃下爲結鞭經曰病發於陰而反下之因作

痞太陰中風四肢煩疼陽微陰澁而長者爲欲愈

脾也主營四末太陰中風四肢煩疼者風淫未疾也表邪少則微裏向和則澁而長長者陽也陰病見陽

脉則生以陰得陽太陰病欲解時從亥至丑

脾爲陰土

寒作和解

王於丑亥子向
王故爲解時
太陰病脈浮者可發汗宜桂枝湯

浮爲在表沉爲在裏太陰病脈
浮者邪在經也故當汗解之
自利不渴者屬太陰

以其藏有寒故也當溫之宜服四逆輩
自利而渴者屬少陰爲寒

在下焦自利不渴者屬太陰爲寒
傷寒脈浮而緩手
在中焦與四逆等湯以溫其藏

足自溫者繫在太陰太陰當發身黃若小便自利者

不能發黃至七八日雖暴煩下利日十餘行必自止

以脾家實腐穢當去故也
太陰病至七八日大便鞭者爲太陰入府傳於陽明

也今至七八日暴煩下利十餘行者脾家實腐穢去
也下利煩躁者死此以脾氣和逐邪下泄故雖暴煩

下利日十餘行
本太陽病醫反下之因爾腹滿時痛
而利必自止

者屬太陰也桂枝加芍藥湯主之
表邪未罷醫下之邪因乘虛傳於太

陰裏氣不和故腹滿時痛與桂枝湯以解表加芍藥以和裏

大實痛者桂枝加大

黃湯生之大實大滿自可除下之

太陰爲病脈弱其

人續自便利設當行大黃芍藥者宜減之以其人胃

氣弱易動故也

腹滿痛者太陰病也脈弱其人續自便利則邪雖在裏未成大實欲與大

黃芍藥攻滿痛者宜少與之以胃氣尚弱易爲動利也

辨少陰病脈證并治法第十一

少陰之爲病脈微細但欲寐也

少陰爲病脈微細爲和氣傳裏深也衛氣

行於陽則寤行於陰則寐邪傳少陰則氣行於陰而不行於陽故但欲寐

少陰病欲吐不

吐心煩但欲寐五六日自利而渴者屬少陰也虛故

引水自救若小便色白者少陰病形悉具小便白者

以下焦虛有寒不能制水故令色白也

欲吐不吐心煩者表邪傳

裏也若腹滿痛則屬太陰此但欲寐則知屬少陰五

六日邪傳少陰之時自利不渴者寒在中焦屬太陰

此自利而渴為寒在下焦屬少陰腎虛水燥渴欲引

水自救下焦虛寒不能制水小便色白也經曰下利

欲飲水者以有熱故也此下利雖渴病人脈陰陽俱

然以小便色白明非裏熱不可不察

緊反汗出者亡陽也此屬少陰法當咽痛而復吐利

脈陰陽俱緊為少陰傷寒法當無汗反汗出者陽虛

不固也故云亡陽以無陽陰獨是屬少陰內經曰邪

客少陰之絡令人噤痛不可內食少陰病欬而下利

少陰寒甚是當咽痛而復吐利

讖語者被火氣劫故也小便必難以強責少陰汗也

欬而下利裏寒而亡津液也反以火劫強責少陰少
汗者津液內竭加火氣煩之故讖語小便難也少
陰病脈細沉數病為在裏不可發汗少陰病始得之
反發熱脈沉者

為邪在經可與麻黃附子細辛湯發汗此少陰病脉

少陰病脉細沉數為病在裏故不可發汗

微不可發汗亡陽故也陽已虛尺脉弱濇者復不可

下之脉微為亡陽表虛不可發汗脉少陰病脉緊至

七八日自下利脉暴微手足反温脉緊反去者為欲

解也雖煩下利必自愈少陰病脉緊者寒甚也至七

利脉暴微者寒氣得泄也八日傳經盡欲解之時自下

則手足厥而脉緊不去今手足反温脉緊反去知陽

氣復寒氣去故為欲解下利煩躁者少陰病下利若

逆此正勝邪微雖煩下利必自止

利自止惡寒而踈卧手足温者可治少陰病下利惡

陰勝也利目止手足温者少陰病惡寒而踈時自煩

裏和陽氣得復故為可治惡寒而踈陰寒甚也時時自煩欲

欲去衣被者可治去衣被為陽氣得復故云可治

少陰中風脈陽微陰浮者為欲愈

少陰中風陽脈當浮而陽脈微者表

邪緩也陰脈當沉而陰脈浮者裏氣和也

少陰病欲

陽中有陰陰中有陽陰陽調和故為欲愈

解時從子至寅上

陽生於子子為一陽丑為二陽寅為三陽少陰解於此者陰得陽則

也解少陰病吐利手足不逆冷反發熱者不死脈不至

者灸少陰七壯

經曰少陰病吐利躁煩四逆者死吐利手足不厥冷者則陽氣不衰雖反

發熱不死脈不至者吐利暴虛也灸少陰七壯以通其脈

少陰病八九日一身手

足盡熱者以熱在膀胱必便血也

膀胱太陽也少陰太陽為表裏少陰

病至八九日寒邪變熱復傳太陽太陽為諸陽主氣熱在太陽故一身手足盡熱太陽經多血少氣為熱

所乘則血散下行必便血也

少陰病但厥無汗而強發之必動其

血未知從何道出或從口鼻或從目出是名下厥上

竭為難治

但厥無汗，熱行於裏也。而強發汗，虛其經絡，熱乘經虛，迫血妄行，從虛而出，或從口

鼻或從目出，諸厥者皆屬於下，但厥為下厥血，少陰溢於上為上竭，傷氣損血邪甚，正虛故為難治。

病惡寒身蹇而利手足逆冷者不治

針經曰：多熱者易已，多寒者難

已此內外寒極純少陰病吐利躁煩四逆者死

吐利者寒

陰無陽故不治甚於裏四逆者寒甚於表躁

少陰病下利止而頭眩

時時自冒者死

下利止則水穀竭眩，胃則陽氣脫故死。

少陰病四逆惡

寒而身蹇脉不至不煩而躁者死

四逆惡寒而身蹇，則寒甚脉不至，則

真氣絕煩熱也躁亂也若憤躁之躁從煩至躁為執

來有漸則猶可不煩而躁是氣欲脫而爭也譬猶燈

將滅而暴明少陰病六七日息高者死

其能久乎少陰病六七日不愈而息高者生氣斷絕也

少陰病脉微細沉但欲臥汗

出不煩自欲吐至五六日自利復煩躁不得臥寐者

死陰氣方盛至五六日傳經盡陽氣得復則愈反更

故自利煩躁不得臥寐則正氣弱陽不能復病勝藏

死少陰病始得之反發熱脈沉者麻黃附子細辛湯

主之少陰病當無熱惡寒反發熱者邪在表也雖脈

沉以始得則邪氣未深亦當溫劑發汗以散之

麻黃附子細辛湯方

麻黃二兩去節甘熱 細辛二兩辛熱 附子一枚炮去皮破八片辛熱

內經曰寒淫於內治以甘熱佐以苦辛以辛潤之

麻黃之甘以解少陰之寒細辛附子之辛以溫少陰之

右三味以水一斗先煮麻黃減二升去土沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日麻黃附子甘草湯微發汗以二

三日無證故微發汗也

二三日邪未深也既無吐利厥逆諸裏證則可與麻黃附

子甘草湯微汗以散之

麻黃附子甘草湯方

麻黃

二兩
去節

甘草

二兩
炙

附子

一枚
炮
去皮

麻黃甘草之甘以散表
寒附子之辛以溫經氣

右三味以水七升先煮麻黃一兩沸去上沫內諸

藥煮取三升去滓溫服一升日三服

少陰病得之二三日以上心中煩不得卧黃連阿膠

湯主之

脈經曰風傷陽寒傷陰少陰受病則得之於
寒二三日已上寒極變熱之時熱煩於內心

中煩不得臥也與黃連阿膠湯扶陰散熱

黃連阿膠湯方

黃連

四兩 苦寒

黃芩

一兩 苦寒

芍藥

二兩 酸平

雞子黃

二枚 甘溫

阿膠

三兩 甘溫

陽有餘以苦除之黃芩黃連之苦以除熱陰不足以甘補之雞子黃阿膠之甘以補血酸收也泄也芍藥之酸收陰氣而泄邪熱

右五味以水五升先煮三物取二升去滓內膠烱

盡小冷內雞子黃攪令相得溫服七合日三服

少陰病得之一二日口中和其背惡寒者當灸之附

子湯主之

少陰客熱則口燥舌乾而渴口中和者不苦不燥是無熱也背為陽背惡寒者陽氣

弱陰氣勝也經曰無熱惡寒者發於陰也灸之助陽消陰與附子湯溫經散寒

附子湯方

附子

二枚炮破八片去皮辛熱

茯苓

三兩甘平

人參

二兩甘溫

白朮

四兩甘溫

芍藥

三兩酸平

辛以散之附子之辛以散寒甘以緩之茯苓人參白朮之甘以補陽酸以收之芍藥之酸以扶陰所以然者偏陰偏陽則爲病火欲實水當平之不欲偏勝也

右五味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服

少陰病身體痛手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之

少陰腎水而主骨節身體疼痛支冷脈沉者寒盛於陰也身疼骨痛若脈浮手足熱則可發汗此手足寒

脈沉故當與少陰病下利便膿血者桃花湯主之陽
 附子湯溫經少陰病下利便膿血者協熱也少陰病下利便膿血
 者下焦不約而裏寒也與桃花湯固下散寒

桃花湯方

赤石脂一斤一半篩末甘溫乾薑一兩兩兩粳米一升

瀉可去脫赤石脂瀉以固腸胃辛以散之
 乾薑之辛以散裏寒粳米之甘以補正氣

右三味以水七升煮米令熟去滓溫服七合內赤

石脂末方寸七日三服若一服愈餘勿服

少陰病二三日至四五日腹痛小便不利下利不止

便膿血者桃花湯主之二三日以至四五日寒邪入裏深也腹痛者裏寒也小便

不利者水穀不別也下利不止便膿血者腸胃虛弱下焦不固也與桃花湯固腸止利少陰病

下利便膿血者可刺

下焦血氣留聚腐化則為膿少血刺之以利下焦宣通血氣

陰病吐利手足厥冷煩躁欲死者吳茱萸湯主之

吐利

手足厥冷則陰寒氣甚煩躁欲死者

少陰病下利咽

陽氣內爭與吳茱萸湯助陽散寒

痛胃滿心煩者猪膚湯主之

少陰之脈從腎上貫肝膈入肺中循喉嚨其支

別者從肺出絡心注胃中邪自陽經傳於少陰陰虛客熱下利咽痛胃滿心煩也與猪膚湯調陰散熱

猪膚湯方

猪膚一斤味甘寒

猪水畜也其氣先入腎少陰客熱是以猪膚解之加白蜜以潤燥除煩白粉以益氣斷利

右一味以水一斗煮取五升去滓加白蜜一升白

粉五合熬香和令相得温分六服

少陰病二三日咽痛者可與甘草湯不差者與桔梗

湯陽邪傳於少陰邪熱爲咽痛服甘草湯則差若寒熱相搏爲咽痛者服甘草湯若不差與桔梗湯以

和少陰之氣

甘草湯方

甘草

二兩

右一味以水三升煮取一升半去滓溫服七合日

二服

桔梗湯方

桔梗

一兩味辛甘微溫

甘草

二兩味甘平

桔梗辛溫以散寒甘草甘平以除熱甘桔相合以調寒熱

右二味以水三升煮取一升去滓分温再服

少陰病咽中傷生瘡不能語言聲不出者苦酒湯主

之熱傷於絡則經絡乾燥使咽中傷生瘡不能

苦酒湯方

半夏

洗破如棗核十四枚辛温

雞子

一枚去黃內上苦酒著雞子殼中甘微寒

辛以散之半夏之辛以發音聲甘以緩之雞子之甘以緩咽痛酸以收之苦酒之酸以飲咽瘡

右二味內半夏著苦酒中以雞子殼置刀鐸中安

火上令三沸去滓少少含嚥之不差更作三劑

少陰病咽中痛半夏散及湯主之

甘草湯主少陰客熱咽痛桔梗湯主

少陰寒熱相搏咽痛半夏散及湯主少陰客寒咽痛也

半夏散及湯方

半夏

洗辛溫

桂枝

去皮辛熱

甘草

炙甘平以
上各等分

內經曰寒淫所勝平以辛熱佐以甘苦半夏
桂枝之辛以散經寒甘草之甘以緩正氣

已上三味各別搗篩已合治之白飲和服方寸七

日三服若不能散服者以水一升煎七沸內散兩

方寸七更煎三沸下火令小冷少少嚥之

少陰病下利白通湯主之

少陰主水少陰客寒不能
制水故自利也白通湯溫

裏散
寒

白通湯方

葱白

四莖辛溫

乾薑

一兩辛熱

附子

一枚生用去皮
破八片辛熱

內經曰腎若燥急食辛以潤之葱白之辛以通陽氣薑附之辛以散陰寒

右三味以水三升煮取一升去滓分溫再服

少陰病下利脉微者與白通湯利不止厥逆無脉乾

嘔煩者白通加猪膽汁湯主之服湯脉暴出者死微

續者生

少陰病下利脉微爲寒極陰勝與白通湯復陽散寒服湯利不止厥逆無脉乾嘔煩者寒

氣太甚內爲格拒陽氣逆亂也與白通湯加猪膽汁湯以和之內經曰逆而從之從而逆之又曰逆者正治從者反治此之謂也服湯脉暴出者正氣因發泄而脫也故死脉微續者陽氣漸復也故生

白通加猪膽汁湯方

葱白

四莖

乾薑

一兩

附子

一枚生去皮破八片

人尿

五合

猪膽汁

一合

內經曰若調寒熱之逆冷熱必行則熱物冷服下
嗑之後冷體既消熱性便發由是病氣隨愈嘔噦
皆除情且不違而致大益此和人尿猪膽汁鹹苦
寒物於白通湯熱劑中要其氣相從則可以去格
拒之寒也

已上三味以水三升煮取一升去滓內膽汁入尿
和令相得分溫再服若無膽亦可用

少陰病二三日不已至四五日腹痛小便不利四肢

沉重疼痛自下利者此為有水氣其人或欬或小便

利或下利或嘔者真武湯主之少陰病二三日則邪

氣已深腎主水腎病不能制水水飲停為水氣腹痛

者寒濕內甚也四肢沉重疼痛寒濕外甚也小便不

利自下利者濕勝而水穀不別也內經曰
濕勝則濡泄與真武湯益陽氣散寒濕

真武湯方

茯苓

三兩
甘平

芍藥

三兩
酸平

生薑

三兩切
辛溫

白朮

二兩
甘溫

附子

一枚炮去皮
破八片辛熱

脾惡濕甘先入脾茯苓白朮之甘以益脾逐水寒淫所勝平以辛熱濕淫所勝佐以酸平附子芍藥生薑之酸辛以溫經散濕

右五味以水八升煮取三升去滓溫服七合日三

服後加減法

若欬者加五味子半升細辛乾薑各一兩

氣逆欬者五味子之

酸以收逆氣水寒相搏則欬細辛乾薑之辛以散水寒

若小便利者去茯苓

小便

利則無伏水故去茯苓

若下利者去芍藥加乾薑二兩

芍藥之酸泄氣

乾薑之辛散寒若嘔者去附子加生薑足前成半斤氣逆則嘔附子

補氣生薑散氣千金曰嘔家多服生薑此為嘔家聖藥少陰病下利清穀裏寒

外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人面赤色

或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆

湯主之下利清穀手足厥逆脈微欲絕為裏寒身熱

外不相通也與通脈四逆湯散陰通陽

通脈四逆湯方

甘草

二兩炙

附子

大者一枚生用去皮破八片

乾薑

三兩強人可四兩

右三味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服

其脈即出者愈

面色赤者加葱九莖葱味辛以通陽氣腹中痛者去葱加芍

藥二兩芍藥之酸通寒利腹中痛為氣不通也嘔者加生薑二兩辛以散之

嘔為氣不散也咽痛者去芍藥加桔梗一兩咽中如結加桔梗則能散之

利止脈不出者去桔梗加人參二兩利止脈不出者亡血也加人參

以補之經曰脈微而利亡血也四逆加人參湯主之脈病皆與方相應者乃可服之少陰病四

逆其人或欬或悸或小便不利或腹中痛或泄利下

重者四逆散主之四逆者四肢不溫也傷寒邪在三陽則手足必熱傳到太陰手足自

溫至少陰則邪熱漸深故四肢逆而不溫也及至厥陰則手足厥冷是又甚於逆四逆散以散傳陰之熱

四逆散方

甘草炙甘平

枳實破水漬炙乾苦寒

柴胡苦寒

芍藥酸微寒

內經曰熱淫於內佐以甘苦以酸收之以苦發之
枳實甘草之苦甘以泄裏熱芍藥之酸以收陰氣
柴胡之苦以發表熱

右四味各十分搗篩白飲和服方寸七日三服

欬者加五味子乾薑各五分并主下利肺寒氣逆則欬五味子之

酸收逆氣乾薑之辛散肺寒并主下痢者肺與大腸為表裏上欬下利治則頗同悸者加桂

枝五分悸者氣虛而不能通利心下築築然悸小便

不利者加茯苓五分茯苓味甘而淡用以滲泄腹中痛者加附子

一枚炮令坼裏虛遇邪則痛泄利下重者先以水五

升煮薤白三升煮取三升去滓以散三方寸七內湯

中煮取一升半分溫再服

泄利下重者下焦氣滯也加薤白以泄氣滯

少

陰病下利六七日欬而嘔渴心煩不得眠者猪苓湯

主之

下利不渴者裏寒也經曰自利不渴者屬太陰以其藏寒故也此下利嘔渴知非裏寒心煩不

得眠知協熱也與猪苓湯滲泄小便分別少陰病得

水穀經日復不止當利其小便此之謂歟

傷寒傳經五六

之二三日口燥咽乾者急下之宜大承氣湯

日邪傳少陰則口燥舌乾而渴為邪漸深也今少陰病得之二三日邪氣未深入之時便作口燥咽乾者是邪熱已甚腎水乾也急與少陰病自利清水色純大承氣湯下之以全腎也

青心下必痛口乾燥者急下之宜大承氣湯

少陰腎水也青

肝色也自利色青為肝邪乘腎難經曰從前來者為實邪以腎蘊實邪必心下痛口乾燥也與大承氣湯

以下少陰病六七日腹脹不大便者急下之宜大承

氣湯

此少陰入府也六七日少陰之邪入府之時陽明內熱壅甚腹滿不大便也陽明病士勝腎水

則乾急

與大承氣湯下之以救腎水

少陰病脈沉者急溫之宜四逆湯

既吐且利

小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱

脈微欲絕

者不云急溫此少陰病脈沉而云急溫者

彼雖寒甚

然而證已形見於外治之則有成法此初

頭脈沉

未有形證不知邪氣所之將發何病是急與

四逆湯

少陰病飲食入口則吐心中溫溫欲吐復不

溫之

能吐始得之手足寒脈弦遲者此胸中實不可下也

當吐之若膈上有寒飲乾嘔者不可吐也急溫之宜

四逆湯

傷寒表邪傳裏至於少陰少陰之脈從肺出絡心注胷中邪既留於胷中而不散者飲食

入口則吐

心中溫溫欲吐陽受氣於胷中邪既留於

胸中則陽氣

不得宣發於外是以始得之手足寒脈

弦遲此是胸中實

不可下而當吐其膈上有寒飲亦

使人心中心中溫溫而手足寒吐則物出嘔則物不出吐

與嘔別焉胃中實則吐而物出若膈上有寒飲則但乾嘔而不吐也此不可吐可與四逆湯以溫其膈

少陰病下利脈微澁嘔而汗出必數更衣反少者當

溫其上灸之

脈微爲亡陽澁爲亡血下利嘔而汗出亡陽亡血也津液不足裏有虛寒必數

更衣反少者溫其上以助其陽也灸之以消其陰

辨厥陰病脈證并治法第十二

厥陰之爲病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食

食則吐蚘下之利不止

邪傳厥陰則熱已深也邪自太陽傳至太陰則腹滿而噎

乾未成渴也邪至少陰者口燥舌乾而渴未成消也

至厥陰成消渴者熱甚能消水故也飲水多而小便

少者謂之消渴木生於火肝氣通心厥陰客熱氣上撞心中疼熱傷寒六七日厥陰受病之時爲傳經

盡則當入府胃虛客熱飢不欲食蚘在胃中無食則動聞食臭而出得食吐蚘此熱在厥陰經也若便下

之虛其胃氣厥陰木厥陰中風脈微浮為欲愈不浮

邪相乘必吐下不止

經曰陰病見陽脈而生浮者陽也厥陰中風脈微浮為邪氣還表向汗之時故云欲愈

厥陰病欲解時從丑至卯上

厥陰木也王於卯丑寅向王故為解時

厥

陰病渴欲飲水者少少與之愈

邪至厥陰為傳經盡欲汗之時渴欲得水

者少少與之胃氣得潤則愈

諸四逆厥者不可下之虛家亦然

四逆

者四肢不溫也厥者手足冷也皆陽氣少而陰氣多故不可下虛家亦然下之是為重虛金匱玉函曰虛

者十補勿瀉之

傷寒先厥後發熱而利者必自止見厥復

利陰氣勝則厥逆而利陽氣復則發熱利必自止見厥則陰氣還勝而復利也傷寒始發

熱六日厥反九日而利凡厥利者當不能食今反能

食者恐為除中食以索餅不發熱者知胃氣尚在必

愈恐暴熱來出而復去也後三日脉之其熱續在者

期之且日夜半愈所以然者本發熱六日厥反九日

復發熱三日并前六日亦爲九日與厥相應故期之

且日夜半愈後三日脉之而脉數其熱不罷者此爲

熱氣有餘必發癰膿也

始發熱邪在表也至六日邪傳厥陰陰氣勝者作厥而利

厥反九日陰寒氣多當不能食而反能食者恐爲除中除去也中胃氣也言邪氣太甚除去胃氣胃欲引食自救故暴能食此欲勝也食以索餅試之若胃氣絕得頰則必發熱若不發熱者胃氣尚在也恐是寒極變熱因暴熱來而復去使之能食并除中也金匱要畧曰病人素不能食而反暴思之必發熱後三日脉之其熱續在者陽氣勝也期之且日夜半愈若旦日不愈後三日脉數而熱不罷者爲熱氣有餘必發癰膿經曰數脈傷寒脉遲六七日而反與黃芩湯徹不時則生惡瘡

其熱脈遲為寒今與黃芩湯復除其熱腹中應冷當

不能食今反能食此名除中必死傷寒脈遲六七日為寒氣已深反與

黃芩湯湯寒藥兩寒相搏腹中當冷冷不消穀則不能食反能食者除中也四時皆以胃氣為本胃氣已絕

故云必死傷寒先厥後發熱下利必自止而反汗出咽中

痛者其喉為痺發熱無汗而利必自止若不止必便

膿血便膿血者其喉不痺傷寒先厥而利陰寒氣勝也寒極變熱後發熱下利

必自止而反汗出咽中痛其喉為痺者熱氣上行也

發熱無汗而利必自止利不止必便膿血者熱氣下

行也熱氣下而不傷寒一二日至四五日而厥者必

發熱前熱者後必厥厥深者熱亦深厥微者熱亦微

厥應下之而反發汗者必口傷爛赤前厥後發熱者寒極生熱也前

熱後厥者陽氣內陷也厥深熱深厥微熱微隨陽氣陷之深淺也熱之伏深必須下去之反發汗者引熱上行必口傷爛赤內經傷寒病厥五日熱亦五日設曰火氣內發上爲口糜

六日當復厥不厥者自愈厥終不過五日以熱五日

故知自愈

陰勝則厥陽勝則熱先厥五日爲陰勝至六日陽復勝熱亦五日後復厥者陰復勝

若不厥爲陽全勝故自愈經曰發熱四日凡厥者陰厥反三日復熱四日厥少熱多其病爲愈

陽氣不相順接便爲厥厥者手足逆冷是也

手之三陰三陽

相接於手十指足之三陰三陽相接於足十指陽傷氣內陷陽不與陰相順接故手足爲之厥冷也

寒脈微而厥至七八日膚冷其人躁無暫安時者此

爲藏厥非爲蚘厥也蚘厥者其人當吐蚘令病者靜

而復時煩此爲藏寒蚘上八膈故煩須臾復止得食

而嘔又煩者虵聞食臭出其人當自吐虵虵厥者烏

梅圓主之又主久利方

藏厥者死陽氣絕也虵厥雖厥而煩吐虵已則靜不若藏

厥而躁無暫安時也病人藏寒胃虛虵動上膈聞食臭出因而吐虵與烏梅圓溫藏安蟲

烏梅圓方

烏梅

三百箇味酸溫

細辛

六兩辛熱

乾薑

十兩辛熱

黃連

一斤苦寒

當歸

四兩辛溫

附子

六兩辛熱

蜀椒

四兩去汗辛熱

桂枝

六兩辛熱

人參

六兩甘溫

黃蘗

六兩苦寒

肺主氣肺欲收急食酸以收之烏梅之酸以收肺氣脾欲緩急食甘以緩之參之甘以緩脾氣寒淫於內以辛潤之以苦堅之當歸桂椒細辛之辛以潤內寒寒淫所勝平以辛熱薑附之辛熱以勝

寒虵得甘則動得苦則安黃連黃蘗之苦以安虵

黃連黃蘗之苦以安虵

右十味異搗篩合治之以苦酒漬烏梅一宿去核
蒸之五升米下飯熟搗成泥和藥令相得內日中
與蜜杵二千下圓如梧桐子大先食飲服十圓日
三服稍加至二十圓禁生冷滑物臭食等

傷寒熱少厥微指頭寒默默不欲食煩躁數日小便

利色白者此熱除也欲得食其病爲愈若厥而嘔胃

脇煩滿者其後必便血指頭寒者是厥微熱少也默默不欲食煩躁者邪熱初傳

裏也數日之後小便色白裏熱去欲得食爲胃氣已

和其病爲愈厥陰之脈挾胃貫膈布脇助厥而嘔胃

脇煩滿者傳邪之熱甚於裏也厥陰肝主血後病者
數日熱不去又不得外泄迫血下行必致便血病者
手足厥冷言我不結胃小腹滿按之痛者此冷結在

傷身論
卷六
十一
膀胱關元也

手足厥不結胃者無熱也小傷寒發熱腹滿按之痛下焦冷結也

傷寒發熱

四日厥反三日復熱四日厥少熱多其病當愈四日

至七日熱不除者其後必便膿血

先熱後厥者陽氣邪傳裏也發熱為

邪氣在表至四日後厥者傳之陰也後三日復傳陽經則復熱厥少則邪微熱多為陽勝其病為愈至七

日傳經盡熱除則愈熱不除者為熱氣傷寒厥四日有餘內搏厥陰之血其後必大便膿血

熱反三日復厥五日其病為進寒多熱少陽氣退故

為進也

傷寒陰勝者先厥至四日邪傳裏重陰必陽却熱三日七日傳經盡當愈若不愈而復厥

者傳作再經至四日則當復熱若不復熱至五日厥不除者陰勝於陽其病進也

傷寒六七

日脈微手足厥冷煩躁灸厥陰厥不還者死

傷寒六七日則

正氣當復邪氣當罷脈浮身熱為欲解若反脈微而厥則陰勝陽也煩躁者陽虛而爭也灸厥陰以復其

陽厥不還則陽氣已絕不能復正而死傷寒發熱下利厥逆躁不得卧

者死傷寒發熱邪在表也下利厥逆陽氣傷寒發熱

下利至甚厥不止者死全匱要畧曰六府氣絕於外者手足寒五藏氣絕於內者

利下不禁傷寒發熱為邪氣獨甚下利至甚厥不止為府藏氣絕故死傷寒六七日不利便發熱而利其人汗出不止者死有陰無陽故也

傷寒至七日為邪正爭之時正勝則生邪勝則死始

不下利而暴忽發熱下利汗出不止者邪氣勝正陽

氣脫也傷寒五六日不結胃腹濡脈虛復厥者不可

下此為亡血下之死傷寒五六日邪氣當作裏實之時若不結胃而腹濡者裏無熱

也脈虛者亡血也復厥者陽氣少也不可下下之發

為重虛故死金匱玉函曰虛者重瀉真氣乃絕發熱而厥七日下利者為難治發熱而厥邪傳裏也至七日傳經盡則正氣勝

邪當汗出而解反下利則傷寒脈促手足厥逆者可

邪氣勝裏氣虛則為難治傷寒脈促手足厥逆者

灸之脈促則為陽虛不相續厥逆則傷寒脈滑而厥

者裏有熱也白虎湯主之滑為陽厥氣內陷是裏熱也

手足厥寒脈細欲絕者當歸四逆湯主之手足厥寒者陽氣外

虛不溫四末脈細欲絕者陰血內弱脈行不利與當歸四逆湯助陽生陰也

當歸四逆湯方

當歸三兩 辛溫 桂枝三兩 辛熱 芍藥三兩 酸寒 細辛三兩 辛熱

大棗二十五 商甘溫 甘草二兩 甘平 通草二兩 甘平

內經曰脈者血之府也諸血者皆屬心通脈者必

先補心益血苦先入於心當歸之苦以助心血心

苦緩急食酸以收之芍藥之酸以收心氣肝苦急

急食甘以緩之大棗甘草通草之甘以緩陰血

右七味以水八升煮取三升去滓溫服一升日三

服

若其人內有久寒者宜當歸四逆加吳茱萸生薑湯

主之

茱萸辛溫以散久寒生薑辛溫以行陽氣

大汗出熱不去內拘急四

肢疼又下利厥逆而惡寒者四逆湯主之

大汗出則熱當去熱

反不去者亡陽也內拘急下利者寒甚於裏四肢大

疼厥逆而惡寒者寒甚於表與四逆湯復陽散寒大

汗若大下利而厥冷者四逆湯主之內外雖殊其亡

津液損陽氣則一也陽虛陰勝故生厥逆與四逆湯固陽退陰

病人手足厥冷脈乍

緊者邪結在胸中心下滿而煩飢不能食者病在胃

中當須吐之宜瓜蒂散

手足厥冷者邪氣內陷也脈緊牢者爲實邪氣入府則脈

沉今脈乍緊知邪結在胃中為實故心下滿而煩胃
中無邪則喜飢以病在胃中雖飢而不能食與瓜蒂
散以吐胃傷寒厥而心下悸者宜先治水當服茯苓
中之邪

甘草湯却治其厥不爾水漬入胃必作利也金匱要

停心下甚者則悸厥雖寒勝然以心下悸為水飲內

甚先與茯苓甘草湯治其水而後治其厥若先治厥

則水飲浸漬入傷寒六七日大下後寸脈沉而遲手

胃必作下利

足厥逆下部脈不至咽喉不利唾膿血泄利不止者

為難治麻黃升麻湯主之傷寒六七日邪傳厥陰之

氣內陷寸脈遲而手足厥逆下部脈不至焦氣虛陽

貫膈上注肺循喉嚨在厥陰隨經射肺因亡津液遂

成肺痿咽喉不利而唾膿血也金匱要畧曰肺痿之

病從何得之被快藥下利重亡津液故得之若泄利

不止者為裏氣大虛故云難治與

麻黃升麻湯以調肝肺之氣

麻黃升麻湯方

麻黃

二兩半去節甘溫

升麻

一兩一分甘平

當歸

一兩一分辛溫

知母

苦寒

黃芩

苦寒

萎蕤

甘平各十八銖

石膏

碎綿裹甘寒

白朮

甘溫

乾薑

辛熱

芍藥

酸平

天門冬

去心甘平

桂枝

辛熱

茯苓

甘平

甘草

炙甘平各六銖

玉函曰大熱之氣寒以取之甚熱之氣以汗發之麻黃升麻之甘以發浮熱正氣虛者以辛潤之當歸桂薑之辛以散寒上熱者以苦泄之知母黃芩之苦涼心去熱津液少者以甘潤之茯苓白朮之甘緩脾生津肺燥氣熱以酸收之以甘緩之芍藥之酸以歛逆氣萎蕤天門冬石膏甘草之甘潤肺

除熱

右十四味以水一斗先煮麻黃一兩沸去上沫內諸藥煮取三升去滓分溫三服相去如炊三斗米頃令盡汗出愈

傷寒四五日腹中痛若轉氣下趨少腹者此欲自利

也傷寒四五日邪氣傳裏之時腹中痛轉氣下趨少腹者裏虛遇寒寒氣下行欲作自利也傷寒

本自寒下醫復吐下之寒格更逆吐下若食入口即

吐乾薑黃連黃芩人參湯主之傷寒邪自傳表爲本目寒下醫反吐下損

傷正氣寒氣內爲格拒經日格則吐逆食入口即吐謂之寒格更復吐下則重虛而死是更逆吐下與乾

薑黃連黃芩人參湯以通寒格

乾薑黃連黃芩人參湯方

乾薑

辛熱

黃連

苦寒

黃芩

苦寒

人參

甘溫各三兩

辛以散之甘以緩之乾薑人參之甘辛以補正氣苦以泄之黃連黃芩之苦以通寒格

右四味以水六升煮取二升去滓分溫再服

下利有微熱而渴脈弱者今自愈

下利陰寒之疾反大熱者逆有微熱

而渴裏氣方溫也經曰諸弱發熱脈弱者陽氣得復也今必自愈

下利脈數有微熱

汗出今自愈設復緊為未解

下利陰病也脈數陽脈也陰病見陽脈者生微

熱汗出陽氣得通也利必自愈諸緊為寒設復脈緊陰氣猶勝故云未解

下利手足厥冷

無脈者灸之不溫若脈不還反微喘者死

下利手足厥逆無脈

者陰氣獨勝陽氣大虛也灸之陽氣復手足溫而脈還為欲愈若手足不溫脈不還者陽已絕也反微喘

者陽氣脫也少陰負趺陽者為順也

少陰腎水趺陽脾土下利為腎邪干脾水

不勝土則為微邪故為順也 下利寸脈反浮數尺中自濇者必清

膿血下利者脈當沉而遲反浮數者裏有熱也濇為無血尺中自濇者腸胃血散也隨利下必便膿

血清與圓通脈經曰清者廁也下利清穀不可攻表汗出必脹滿下利

者脾胃虛也胃為津液之主發汗亡津液則胃氣愈虛必脹滿 下利脈沉弦者下重

也脈大者為未止脈微弱數者為欲自止雖發熱不

死沉為在裏弦為拘急裏氣不足是主下重大則病進此利未止脈微弱數者邪氣微而陽氣復為欲

自止雖發熱止由陽勝非大逆也 下利脈沉而遲其人面少赤身有

微熱下利清穀者必鬱冒汗出而解病人必微厥所

以然者其面戴陽下虛故也下利清穀脈沉而遲裏有寒也面少赤身有微

熱表未解也病人微厥針經曰下虛則厥表邪欲下解臨汗之時以裏先虛必鬱冒然後汗出而解也

利脈數而渴者今自愈設不差必清膿血以有熱故

也經曰脈數不解而下不止必協熱便膿血也下利後脈絕手足厥冷

時脈還手足溫者生脈不還者死下利後脈絕手足厥冷者無陽也

時周時也周時厥愈脈出為陽氣復則生傷寒下利

若手足不溫脈不還者為陽氣絕則死實者病勝藏也故死難經曰

日十餘行脈反實者死下利者裏虛也脈當微弱反

脈不應病病不下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通

應脈是為死病下利清穀為裏寒身熱不解為外熱

脈四逆湯主之汗出陽氣通行於外則未當厥其汗

出而厥者陽氣大虛也與熱利下重者白頭翁湯主

通脈四逆湯以固陽氣利則津液少熱則傷氣氣虛不利

之致後重也與白頭翁湯散熱厚腸

白頭翁湯方

白頭翁

二兩 苦寒

黃連

苦寒

黃蘗

苦寒

秦皮

苦寒各 三兩

內經曰腎欲堅急食苦以堅之利則下焦虛是以純苦之劑堅之

右四味以水七升煮取二升去滓溫服一升不愈

更服一升

下利腹脹滿身體疼痛者先溫其裏乃攻其表溫裏

宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利腹脹滿者裏有虛寒先與四逆湯溫裏身疼痛爲

表未解利止裏和與桂枝湯攻表

下利欲飲水者以有熱故也白頭

翁湯主之

自利不渴爲藏寒與四逆湯以溫藏下利飲水爲有熱與白頭翁湯以涼中

利讞語者有燥屎也宜小承氣湯

經曰實則讞語有燥屎爲胃實下利

爲腸虛與小承氣湯以下燥屎

下利後更煩按之心下濡者爲虛煩

也宜梔子豉湯

下利後不煩為欲解若更煩而心下堅者恐為穀煩此煩而心下濡者是

邪熱乘虛客於胃中為虛煩也與梔子豉湯吐之則愈

嘔家有癰膿者不可治

嘔膿盡自愈

胃脘有癰則嘔而吐膿不可治嘔得膿盡嘔即自愈

嘔而脈弱小

便復利身有微熱見厥者難治四逆湯主之

嘔而脈弱為邪

氣傳裏嘔則氣上逆而小便當不利小便復利者裏

虛也身有微熱見厥者陰勝陽也為難治與四逆湯

溫裏助陽乾嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

乾嘔吐涎沫者裏寒

也頭痛者寒氣上攻也與吳茱萸湯溫裏散寒

嘔而發熱者小柴胡湯主之

經曰嘔而發熱者柴胡證具

傷寒大吐大下之極虛復極汗出者

以其人外氣怫鬱復與之水以發其汗因得噦所以

然者胃中寒冷故也

大吐大下胃氣極虛復極發汗又亡陽氣外邪怫鬱於表則身

熱醫與之水以發其汗胃傷寒噦而腹滿視其前後
虛得水虛寒相搏成噦也知何部不利利之則愈噦而腹滿氣上而不丁也視
以降其氣前部小便也後部者大便也

釋音

踈音拳不伸也憤扶粉切惡濕上烏路切撞宅江切

虛自愈
與引于
望音
...

宜

注解傷寒論卷七之八

仲景述 王叔和撰次 成無已注解

辨霍亂病脈證并治法第十三

問曰病有霍亂者何答曰嘔吐而利名曰霍亂

三焦者水

穀之道路邪在上焦則吐而不利邪在下焦則利而不吐邪在中焦則既吐且利以飲食不節寒熱不調清濁相干陰陽乖隔遂成霍亂輕者問曰病發熱頭止曰吐利重者揮霍擦亂名曰霍亂問曰病發熱頭痛身疼惡寒吐利者此屬何病答曰此名霍亂自吐

下又利止復更發熱也

發熱頭痛身疼惡寒者本是傷寒因邪入裏傷於脾胃上

吐下利今爲霍亂利止裏和復更發熱者還是傷寒必汗出而解

傷寒其脈微澁者

本是霍亂今是傷寒却四五日至陰經上轉入陰必

利本嘔下利者不可治也欲似大便而反失氣仍不

利者屬陽明也便必鞭十三日愈所以然者經盡故

也微爲亡陽澁爲亡血傷寒脈微澁則本是霍亂吐

利亡陽亡血吐利止傷寒之邪未已還是傷寒却

四五日邪傳陰經之時裏虛遇邪必作自利本嘔者

邪甚於上又利者邪甚於下先霍亂裏氣大虛又傷

寒之邪再傳爲吐利是重虛也故爲不治若欲似大

便而反失氣仍不利者利爲虛不利爲實欲大便而

反失氣裏氣熱也此屬陽明便必鞭也十三日愈者

傷寒六日傳遍三陰三陽後六日再傳經盡則陰陽

之氣和大邪之下利後當便鞭鞭則能食者愈今反

氣去而愈也

不能食到後經中頗能食復過一經能食過之一日

當愈不愈者不屬陽明也下利後亡津液當便鞭能

者爲未和到後經中爲復過一經言七日後再經也

頗能食者胃氣方和過一日當愈不愈者暴熱使之

能食非陽明氣和也惡寒脉微而復利利止亡血也四逆加人

參湯主之

惡寒脉微而利者陽虛陰勝也利止則津液內竭故云亡血金匱玉函曰水竭則無

血與四逆湯温經助陽加人參生津液益血

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多

欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中圓主之

頭痛發熱則邪自風寒而來中焦為寒熱相半之分邪稍高者居陽分則為熱熱多欲飲水者與五苓散以散之邪稍下者居陰分則為寒寒多不用水者與理中丸温之

理中圓方

人參

甘温

甘草

甘平炙

白朮

甘温

乾薑

辛熱已上各二兩

內經曰脾欲緩急食甘以緩之用甘補之人參白朮甘草之甘以緩脾氣調中寒淫所勝平以辛熱

乾薑之辛以温胃散寒

右四味搗篩爲末蜜和丸如雞黃大以沸湯數合
和一丸研碎溫服之日三四夜貳服腹中未熱益
至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用水
八升煮取三升去滓溫服一升日三服加減法

若臍上築者腎氣動也去朮加桂四兩

脾虛腎氣動者臍上築動

內經曰甘者令人中滿木甘壅補朴泄奔豚是相易也

吐多者去朮加生薑三

兩嘔家不喜甘故去朮嘔家多服生薑以辛散之

下多者還用朮悸者加茯

苓貳兩

下多者用朮以去濕悸加茯苓以導氣

渴欲得水者加朮足前

成四兩半

津液不足則渴朮甘以緩之

腹中痛者加人參足前成

四兩半

裏虛則痛加人參以補之

寒者加乾薑足前成四兩半

寒淫

所勝平腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲

以辛熱熱粥一升許微自溫勿發揭衣被胃虛則氣壅腹滿甘令人中滿是去

朮也附子之辛吐利止而身痛不休者當消息和解

以補陽散壅其外宜桂枝湯小和之吐利止裏和也身痛不休表

臺云裏和表吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥

病汗之則愈者四逆湯主之上吐下利裏虛汗出發熱惡寒表

陰勝也與四逆湯助陽退陰既吐且利小便復利而大汗出下利

清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之吐利亡津液則小便

當少小便復利而大汗出津液不禁陽氣大虛也脈

微爲亡陽若無外熱但內寒下利清穀爲純陰此以

外熱爲陽未絕猶吐已下斷汗出而厥四肢拘急不

解脈微欲絕者通脈四逆加猪膽汁湯主之

吐已下斷津液

內竭則不當汗出汗者不當厥今汗出而厥四肢

拘急不解脈微欲絕者陽氣大虛陰氣獨勝也若純

與陽藥恐陰為格拒或嘔或躁不得復入也與通脈

四逆湯加猪膽汁膽苦入心而通脈膽寒補肝而和

陰引置湯藥不被格拒內經曰吐利發汗脈平小煩

微者逆之甚者從之此之謂也

者以新虛不勝穀氣故也

內經曰食入於陰長氣於

陽新虛不勝穀氣是生小

煩

辨陰陽易差後勞復病證并治法第十四

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或

引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝脛

拘急者燒裯散主之 大病新差血氣未復餘熱未盡 強合陰陽得病者名曰易男子

病新差未平復而婦人與之交得病名曰陽易婦人
病新差未平復男子與之交得病名曰陰易以陰陽
相感動其餘毒相染著如換易也其人病身軀重少
氣者損動真氣也少腹裏急引陰中拘攣膝脛拘急
陰氣極也熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花者感動
之毒所易之氣熏蒸於上也與燒裊散以道陰氣
燒裊散方

右取婦人中裊近隱處剪燒灰以水和服方寸匕

日三服小便即利陰頭微腫則愈婦人病取男子
裊當燒灰

大病差後勞復者枳實梔子湯主之若有宿食者加

大黃如博碁子大五六枚

病有勞復有食復傷寒新
差血氣未平餘熱未盡早

作勞動病者名曰勞復病熱少愈而強食之熱有所
藏因其穀氣留搏兩陽相合而病者名曰食復勞復

傷寒論 七之八
則熱氣浮越與枳實梔子豉湯以解
之食復則胃有宿積加大黃以下之

枳實梔子豉湯方

枳實

三枚炙
苦寒

梔子

十四枚
擘苦寒

豉

一升綿
裹苦寒

枳實梔子豉湯則應吐劑此云覆合微似汗出者
以其熱聚於上苦則吐之熱散於表者苦則發之
內經曰火淫所勝以
苦發之此之謂也

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子
煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令
微似汗

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之脈浮者以汗
解之脈沉實者以下解之
差後餘熱未盡更發熱者
與小柴胡湯以和解之脈

浮者熱在表也故以汗解脈沉者熱在裏也故以下解之大病差後從腰已下有

水氣者牡蠣澤瀉散主之大病差後脾胃氣虛不能制約腎水水溢下焦腰以

下為腫也金匱要略曰腰以下腫當利小便與牡蠣澤瀉散利小便而散水也

牡蠣澤瀉散方

牡蠣鹹平澤瀉鹹寒括蔞根苦寒蜀漆辛平洗去腥

葶藶苦寒熬商陸根熬辛酸鹹平海藻鹹寒洗去鹹已上各等分

鹹味湧泄牡蠣澤瀉海藻之鹹以泄水氣內經曰濕淫於內平以苦佐以酸辛以苦泄之蜀漆葶藶

括蔞商陸之酸辛與苦以導腫濕

右七味異擣下篩為散更入白中治之白飲和服

方寸匕小便利止後服日叁

大病差後喜唾久不了了者胃上有寒當以圓藥溫

之宜理中圓

汗後陽氣不足胃中虛寒不內津液故喜唾不了了與理中丸以溫其胃傷

寒解後虛羸少氣氣逆欲吐者竹葉石膏湯主之傷寒

解後津液不足而虛羸餘熱未盡熱則傷氣故少氣氣逆欲吐與竹葉石膏湯調胃散熱

竹葉石膏湯方

竹葉

二把辛平

石膏

一斤甘寒

半夏

半升洗辛溫

麥門冬

一升平去心

人參

三兩甘溫

甘草

二兩甘平炙

粳米

半升甘微寒

辛甘發散而除熱竹葉石膏甘草之甘辛以發散餘熱甘緩脾而益氣麥門冬人參粳米之甘以補不足辛者散也氣逆者欲其散半夏之辛以散氣逆

右七味以水一斗煮取六升去滓內粳米煮米熟
湯成去米溫服一升日三服

病人脈已解而日暮微煩以病新差人強與穀脾胃
氣尚弱不能消穀故令微煩損穀則愈

陽明王於申酉戌宿食在

胃故日暮微煩當
小下之以損宿穀

辨不可發汗病脈證并治法第十五

夫以爲疾病至急倉卒尋按要者難得故重集諸可
與不可方治比之三陰三陽篇中此易見也又時有
不止是三陰三陽出在諸可與不可中也

諸不可汗
不可下病

證藥方前三陰三陽篇中經注已具者更
不復出其餘無者於此已後復注備見
脈濡而弱

弱反在關濡反在巔微反在上濇反在下微則陽氣

不足濇則無血陽氣反微中風汗出而反躁煩濇則

無血厥而且寒陽微發汗躁不得眠寸關為陽脈當

則裏氣不及濡反在巔則表氣不逮浮盛弱反在關

在上以候衛微反在上是陽氣不足榮行脈外浮為

在下以候榮濇反在下是無血也陽微不能固外膝

理開疎風因容之故令汗出而躁煩無血則陰虛不

與陽相順接故厥而且寒陽微無津液則不能作汗

若發汗則必亡陽而躁經曰汗多亡陽遂虛惡風煩

躁不得動氣在右不可發汗發汗則衄而渴心苦煩

眠也飲即吐水動氣者築築然氣動也在右者在臍之右

痛肺氣不治正氣內虛氣動於臍之右也發汗則動

肺氣肺主氣開竅於鼻氣虛則不能衛血血溢妄行

隨氣出於鼻為衄亡津液胃燥則煩渴而動氣在左

心苦煩肺惡寒飲冷則傷肺故飲即吐水動氣在左

不可發汗發汗則頭眩汗不止筋惕肉瞤難經曰肝內證臍左

有動氣按之牢若痛肝氣不治正氣內虛氣動於臍之左也肝為陰之主發汗汗不止則亡陽外虛故頭

眩筋惕肉瞤針動氣在上不可發汗發汗則氣上衝經曰上虛則眩

正在心端難經曰心內證臍上有動氣按之牢若痛心氣不治正氣內虛氣動於臍之上也心

為陽發汗亡陽則愈損心氣腎乘心動氣在下不可虛欲上凌心故氣上衝正在心端

發汗發汗則無汗心中大煩骨節苦疼目運惡寒食

則反吐穀不得前難經曰腎內證臍下有動氣按之牢若痛腎氣不治正氣內虛動氣

發於臍之下也腎者主水發汗則無汗者水不足也心中大煩者腎虛不能制心火也骨節苦疼者腎主

骨也目運者腎病則目眊如無所見惡寒者腎主寒也食則反吐穀不得前者腎水乾也玉冰曰病嘔

而吐食久反咽中閉塞不可發汗發汗則吐血氣欲出是無水也

絕手足厥冷欲得蹠卧不能自温

咽門者胃之系胃經不和則咽內不

利發汗攻陽血隨發散而上必吐血也胃經不和而

反攻表則陽虛於外故氣欲絕手足冷欲蹠而不能

自温諸脉得數動微弱者不可發汗發汗則大便難腹

中乾胃燥而煩其形相象根本異源

動數之脉爲熱在表微弱之脉

爲熱在裏發汗亡津液則熱氣愈甚胃中乾燥故大便難腹中乾胃燥而煩根本雖有表裏之異逆治之後熱傳之則一是脉濡而弱弱反在關濡反在巔弦以病形相象也

反在上微反在下弦爲陽運微爲陰寒上實下虛意

欲得温微弦爲虛不可發汗發汗則寒慄不能自還

弦在上則風傷氣風勝者陽爲之運動微在下則寒傷血血傷者裏爲之陰寒外氣拂鬱爲上實裏有陰

寒爲下虛表熱裏寒意欲得温若反發汗亡陽陰獨故寒慄不能自還

效者則劇數吐

涎沫咽中必乾小便不利心中饑煩晬時而發其形

似瘧有寒無熱虛而寒慄欬而發汗蹇而苦滿腹中

復堅

肺寒氣逆欬者則劇吐涎沫亡津液咽中必乾小便不利膈中陽氣虛心中飢而煩一日一夜

氣大會於肺邪上相擊晬時而發形如寒瘧但寒無熱虛而寒慄發汗攻陽則陽氣愈虛陰寒愈甚故蹇

而苦滿腹厥脈緊不可發汗發汗則聲亂咽嘶舌萎中復堅

聲不得前

厥而脈緊則少陰傷寒也法當溫裏而反發汗則損少陰之氣少陰之脈入肺中循

喉嚨挾舌本腎爲之本肺爲之標本虛諸逆發汗病則標弱故聲亂咽嘶舌萎聲不得前

微者難差劇者言亂目眩者死命將難全

不可發汗而強發之

輕者因發汗加重而難差重者脫其陰陽之氣言亂目眩而死難經曰脫陽者見鬼是此言亂也脫陰者

目盲是此目眩也眩非欬而小便利若失小便者不玄而見玄是近於盲也

可發汗汗出則四肢厥逆冷肺經虛冷上虛不能治下者欬而小便利或失

小便上虛發汗則陽氣外亡四肢者諸陽傷寒頭痛之本陽虛則不與陰相接故四肢厥逆冷

翕翕發熱形象中風常微汗出自嘔者下之益煩心

中懊憹如饑發汗則致瘥身強難以屈伸熏之則發

黃不得小便久則發欬唾傷寒當無汗惡寒今頭痛發熱微汗出自嘔則傷寒

之邪傳而為熱欲行於裏若反下之邪熱乘虛流於

胃中為虛煩心懊憹如飢若發汗則虛表熱歸經絡

熱甚生風故身強直而成瘥若熏之則火熱相合消

燥津液故小便不利而發黃肺惡火久則火熱傷肺

辨可發汗病脈證并治法第十六

大法春夏宜發汗春夏陽氣在外邪氣亦在外故可發汗凡發汗欲令

手足俱周時出以熱熱然一時間許益佳不可令如

水流漓若病不解當重發汗汗多必亡陽陽虛不得

重發汗也

汗緩緩出則表裏之邪悉去汗大出則邪氣不除但亡陽也陽虛爲無津液故不可

重發汗

凡服湯發汗中病便止不必盡劑

汗多則凡云亡陽

可發汗無湯者圓散亦可用要以汗出爲解然不如

湯隨證良驗

聖濟經曰湯液主治本乎腠理壅鬱除邪氣者於湯爲宜金匱玉函曰水能淨

萬物故用湯也

夫病脈浮大問病者言但便鞭爾設利者爲

大逆鞭爲實汗出而解何以故脈浮當以汗解

經曰脈浮

大應發汗醫反下之爲大逆便鞭難雖爲裏實亦當

先解其外若行利藥是爲大逆結胃雖急脈浮大猶

不可下下之卽死况此便難乎經曰本發汗而復下之此爲逆若先發汗治不爲逆

下利後身

疼痛清便自調者急當救表宜桂枝湯發汗外臺云裏和表

病汗之則愈

辨發汗後病脈證并治法第十七

發汗多亡陽讖語者不可下與柴胡桂枝湯和其榮

衛以通津液後自愈胃為水穀之海津液之主發汗

非實熱則不可下與柴胡桂枝湯和其榮
衛通行津液津液生則胃潤讖語自止

此一卷第十七篇凡三十一證前有詳說

辨不可吐第十八

合四證已其太陽篇中

辨可吐第十九

大法春宜吐

春時陽氣在上邪氣亦在上故宜吐

凡用吐湯中病即止

不必盡劑也

要在適當不欲過也

病胃上諸實胃中鬱鬱而痛

不能食欲使人按之而反有涎唾下利日十餘行其

脈反遲寸口脈微滑此可吐之吐之利則止

胃上諸實或痰

實或熱鬱或寒結胃中鬱而痛不能食欲使人按之

反有涎唾者邪在下按之氣下而無涎唾此按之反

有涎唾者知邪在胃中經曰下利脈遲而滑者內實

也今下利日十餘行其脈反遲寸口脈微滑是土實

也故可吐之玉函曰宿食在上腕者當吐之宿食在

上盛不已吐而奪之

者則宜下宿食在上腕則當吐內經曰

其高者因而越之其下者引而竭之病人手足厥

冷脈乍結以客氣在胃中心下滿而煩欲食不能食

者病在胃中當吐之

此與第六卷厥陰門瓜蒂散證同彼云脈乍緊此云脈乍結惟

注解傷寒論卷第九

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨不可下病脉證并治法第二十

脉濡而弱弱反在關濡反在巔微反在上澁反在下
微則陽氣不足澁則無血陽氣反微中風汗出而反
躁煩澁則無血厥而且寒陽微不可下下之則心下

痞鞭

陽微下之陽氣已虛陰氣內甚故心下痞鞭

動氣在右不可下下之

則津液內竭咽燥鼻乾頭眩心悸也

動氣在右肺之動也下之傷胃

動肺津液內竭咽燥鼻乾者肺屬金
主燥也頭眩心悸者肺主氣而虛也

動氣在左不可

下下之則腹內拘急食不下動氣更劇雖有身熱固

則欲蹠動氣在左肝之動也下之損脾而肝氣益勝復行於脾故腹內拘急食不下動氣更劇也

雖有身熱以裏氣動氣在上不可下下之則掌握熱不足故卧則欲蹠

煩身上浮冷熱汗自泄欲得水自灌動氣在上心之動也下之則傷

胃內動心氣心為火主熱針經曰心所生病者掌中

熱肝為藏中之陰病則雖有身熱卧則欲蹠作表熱

裏寒也心為藏中之陽病則身上浮冷熱汗自泄欲

得水自灌作表寒裏熱也二藏陰陽寒熱明可見焉

動氣在下不可下下之則腹脹滿卒起頭眩食則下

清穀心下痞也動氣在下腎之動也下之則傷脾腎氣則動腎寒乘脾故有腹滿頭眩下

痞之證也咽中閉塞不可下下之則上輕下重水漿

不下卧則欲蹠身急痛下利日數十行咽中閉塞胃已不和也下

之則閉塞之邪為上輕復傷胃氣為下重至水漿諸
不下卧則欲蹠身急痛下利日數十行知虛寒也諸

外實者不可下下之則發微熱亡脉厥者當臍握熱

外實者表熱也汗之則愈下之爲逆下後裏虛表熱

內陷故發微熱厥深者熱亦深亡脉厥者則陽氣深

陷客於下焦諸虛者不可下下之則大渴求水者易

故當臍握熱愈惡水者劇金匱玉函曰虛者十補勿一瀉之虛家

者陽氣未竭而猶可愈惡脉濡而弱弱反在關濡反

水者陽氣已竭則難可制

在巔弦反在上微反在下眩爲陽運微爲陰寒上實

下虛意欲得溫微弦爲虛虛者不可下也虛家下之是爲重虛

難經曰實實虛虛損不足益微則爲欬欬則吐涎下

有餘此皆是中工所害也

之則欬止而利因不休利不休則胷中如蟲齧粥入

則出小便不利兩脇拘急喘息爲難頸背相引臂則

不仁極寒反汗出身冷若冰眼睛不慧語言不休而

穀氣多入此爲除中口雖欲言舌不得前

內經曰感於寒則受

病微則爲欬甚則爲泄爲痛肺感微寒爲欬則脈亦微也下之氣下欬雖止而因利不休利不休則奪正氣而成危惡胃中如蟲齧粥入則出小便不利兩脇拘急喘息爲難者裏氣損也頸背相引臂爲不仁極寒反汗出身冷如冰者表氣損也表裏損極至陰陽俱脫眼睛不慧語言不休難經曰脫陽者見鬼脫陰者目盲陰陽脫者應不能食而穀多入者此爲除中是胃氣除去也口雖欲言舌不得前氣已衰脫不能運也脈濡而弱弱反在關濡反在巔浮反在上數反在

下浮爲陽虛數爲亡血浮爲虛數爲熱浮爲虛自汗

出而惡寒數爲痛振寒而慄微弱在關胃下爲急喘

汗而不得呼吸呼吸之中痛在於脇振寒相搏形如

瘧狀醫反下之故令脈數發熱狂走見鬼心下爲痞

小便淋瀝小腹甚鞭水使則尿血也弱在關則陰氣內弱濡在巔則

陽氣外弱浮爲虛浮在上則衛不足也故云陽虛陽

虛不因故勝理汗出惡寒數亦爲虛數在下則榮不

及故云亡血亡血則不能溫潤府藏脈數而痛振而

寒慄微弱在關邪氣傳裏也裏虛遇邪胃下爲急喘

而汗出脇下引痛振寒如瘧此裏邪未實表邪未解

醫反下之裏氣益虛邪熱內陷故脈數發熱狂走見

鬼心下爲痞此熱陷於中焦者也若熱氣深陷則脈

客於下焦便小便淋瀝小腹甚鞭小便尿血也

濡而緊濡則衛氣微緊則榮中寒陽微衛中風發熱

而惡寒榮緊胃氣冷微嘔心內煩醫爲有大熱解肌

而發汗亡陽虛煩躁心下苦痞堅表裏俱虛竭卒起

而頭眩客熱在皮膚悵怏不得眠不知胃氣冷緊寒

在關元技巧無所施返水灌其身客熱應時罷慄慄而振寒重被而覆之汗出而胃巔體惕而又振小便為微難寒氣因水發清穀不容間嘔變反腸出顛倒

不得安手足為微逆身冷而內煩遲欲從後救安可

復追還胃冷榮寒陽微中風發熱惡寒微嘔心煩醫不溫胃反為有熱解肌發汗則表虛亡陽煩

躁心下痞堅先裏不足發汗又虛其表表裏俱虛竭

卒起頭眩客熱在表悵快不得眠醫不救裏但責表

熱汲水灌洗以却熱客熱易罷裏寒益增慄而振寒

復以重被覆之表虛遂汗出愈使陽氣虛也巔頂也

頂胃巔體振寒小便難者亡陽也寒因水發下為清

穀上為嘔吐外有厥逆內為躁煩顛倒不安雖欲拯

救不可得也本草曰脈浮而大浮為氣實大為血虛

病勢已過命將難全脈浮而大浮為氣實大為血虛

血虛為無陰孤陽獨下陰部者小便當赤而難胞中

當虛今反小便利而大汗出法應衛家當微今反更

實津液四射榮竭血盡乾煩而不得眠血薄肉消而

成暴液醫復以毒藥攻其胃此為重虛客陽去有期

必下如污泥而死衛為陽榮為陰衛氣強實陰血虛弱陽乘陰虛下至陰部陰部下焦

也陽為熱則消津液當小使赤而難今反小便利而

大汗出者陰氣內弱也經曰陰弱者汗目出是以衛

家不微而反更實榮竭血盡乾煩而不眠血薄則肉

消而成暴液者津液四射也醫反下之又虛其裏是

為重虛孤陽因下而又脫去氣血皆脈數者久數不

止止則邪結正氣不能復正氣却結於臟故邪氣浮

之與皮毛相得脈數者不可下下之則必煩利不止

乘虛而入裏虛協
熱必煩利不止
脈浮大應發汗醫反下之此為大

逆故不可下
病欲吐者不可下
嘔多雖有陽明證不

可攻之
為邪猶在胃中也
太陽病外證未解不可下下之為

逆表未解者雖有裏證亦不可下
當先解外為順若

也若先發汗夫病陽多者熱下之則鞭
陽熱證多則津液少下之

雖除熱復損津液必便難也或謂
無陽陰强大便鞭

者下之則必清穀腹滿
無陽者亡津液也陰强者寒

必清穀腹滿傷寒發熱頭痛微汗出發汗則不識

人熏之則喘不得小便心腹滿下之則短氣小便難

頭痛背強加溫針則衄
傷寒則無汗發熱頭痛微汗出者寒邪變熱欲傳於裏也

發汗則亡陽增熱故不識人若以火熏之則火熱傷氣內消津液結爲裏實故喘不得小便心腹滿若反下之則內虛津液邪欲入裏外動經絡故短氣小便難頭痛背強若加溫針益陽增熱必動其血而爲衄也傷寒脉陰陽俱緊惡寒發熱則脉欲厥厥者脉初來大漸漸小更來漸漸大是其候也如此者惡寒甚者翕翕汗出喉中痛熱多者目赤脉多睛不慧醫復發之咽中則傷若復下之則兩日閉寒多者便清穀熱多者便膿血若熏之則身發黃若熨之則咽燥若小便利者可救之小便難者爲危殆

脉陰陽俱緊則清邪中上濁邪

中下太陽少陰俱感邪也惡寒者少陰發熱者太陽脉欲厥者表邪欲傳裏也惡寒甚者則變熱翕翕汗出喉中痛以少陰之脉循喉嚨故也熱多者太陽多也目赤脉多者睛不慧以太陽之脉起於目故也發

汗攻陽則少陰之熱因發而上行故咽中傷若復下
之則太陽之邪因虛而內陷故兩目閉陰邪下行爲
寒多必便清穀陽邪下行爲熱多必便膿血熏之則
火熱甚身必發黃熨之則火熱輕必爲咽燥小便利
者爲津液未竭猶可救之小便難傷寒發熱口中勃
者津液已絕則難可制而危殆矣

勃氣出頭痛目黃衄不可制貪水者必嘔惡水者厥

若下之咽中生瘡假令手足溫者必下重便膿血頭

痛目黃者若下之則兩目閉貪水者脈必厥其聲嚶

咽喉塞若發汗則戰慄陰陽俱虛惡水者若下之則

裏冷不嗜食大便完穀出若發汗則口中傷舌上白

胎煩躁脈數實不大便六七日後必便血若發汗則

小便自利也

傷寒發熱寒變熱也口中勃勃氣出熱
客上膈也頭痛目黃衄不可制者熱悉

於上也。千金曰：無陽卽厥，無陰卽嘔。貪水者必嘔，則陰虛也。惡水者厥，則陽虛也。發熱口中，勃勃氣出者，咽中已熱也。若下之，亡津液，則咽中生瘡，熱因裏虛而下。若熱氣內結，則手足必厥。設手足溫者，熱氣不結而下。行作協熱利，下重便膿血也。頭痛目黃者，下之熱氣內伏，則目閉也。貪水爲陰虛，下之又虛其裏。陽氣內陷，故脈厥聲嚶咽，喉閉塞陰虛。發汗又虛其陽，使陰陽俱虛而戰慄也。惡水爲陽虛，下之又虛胃氣。虛寒內甚，故裏冷不嗜食。陽虛發汗，則上焦虛燥，故口中傷爛。舌上白胎而煩躁也。經曰：脈數不解，合熱則消穀喜飢。至六七日不大便者，此有瘀血。此脈數實不大便六七日，熱畜血於內也。七日之後邪熱漸解，迫血下行，必便血也。便下利，脈大者虛也。以其血發汗，陰陽俱虛，故小便利。

強下之故也。設脈浮革，因爾腸鳴者，屬當歸四逆湯。

主之。

脈大爲虛，以未應下而下之，利因不休也。浮者

爲寒。寒虛相搏，則腸鳴與當歸四逆湯補虛散寒。

辨可下病脈證并治法第二十一

大法秋宜下

秋時陽氣下行則邪亦在下故宜下

凡服下藥用湯勝圓

中病即止不必盡劑也

湯之為言蕩也滌蕩腸胃漑灌藏府推陳燥結却熱下寒

破散邪疫理導潤澤枯槁悅人皮膚益人氣水能淨萬物故勝丸散中病即止者如承氣湯證云若一

服利則止後服又日若一服識

語止更莫復服是不盡劑也 下利三部脈皆平按

之心下鞭者急下之宜大承氣湯

下利者脈當微厥今反和者此為內

實也下利三部脈平者已為實而又按之

心下鞭則知邪甚也故宜大承氣湯下之 下利脈遲

而滑者內實也利未欲止當下之宜大承氣湯

經曰脈遲

者食乾物得之金匱要略曰滑則穀氣實下利脈遲而滑者胃有宿食也脾胃傷食不消水穀是致下利

者為內實若但以溫中厚腸之藥利必未止可與大承氣湯下去宿食利自止矣

問曰人病

有宿食何以別之師曰寸口脉浮而大按之反澁尺

中亦微而澁故知有宿食當下之宜大承氣湯寸以候外

尺以候內浮以候表沉以候裏寸口脉浮大者氣實

血虛也按之反澁尺中亦微而澁者胃有宿食裏氣

不和也與大承下利不欲食者以有宿食故也當宜

氣湯以下宿食傷食則惡食故不欲食如傷風惡風傷寒惡寒之類也下利

下之與大承氣湯傷食則惡食故不欲食如傷風惡風傷寒惡寒之類也下利

差後至其年月日復發者以病不盡故也當下之宜

大承氣湯乘春則肝先受之乘夏則心先受之乘至陰則脾先受之乘秋則肺先受之假令春

時受病氣必傷肝治之雖愈邪有不盡者至春時元

受月日內外相感邪必復動而病也下利爲腸胃疾

宿積不盡故下利脉反滑當有所去下之乃愈宜大

當下去之

承氣湯脉經曰脉滑者爲病食也下利脉滑則內有宿食故云當有所去與大承氣湯以下宿食

傷寒論

卷九

七

病腹中滿痛者此爲實也當下之宜大承氣湯

金匱要略

日病者腹滿按之不痛爲虛痛爲實可下之腹中滿痛者裏氣壅實也故可下之

傷寒後脈

沉沉者內實也下解之宜大柴胡湯

傷寒後爲表已解脈沉爲裏未

和與大柴胡湯以下內實經曰傷寒

脈雙弦而遲者

必心下鞭脈大而緊者陽中有陰也可以下之宜大

承氣湯

金匱要略曰脈雙弦者寒也經曰遲爲在藏脈雙弦而遲者陰中伏陽也必心下鞭大則

爲陽緊則爲寒脈大而緊者陽中
代陰也與大承氣湯以分陰陽

釋音

齧

魚結切

盥

音貫澡手也

悵

上丑亮切望恨也下於亮切不服也

嚶

於耕切

漑

灌上居代切下音貫注也

注解傷寒論卷第十

仲景述

王叔和撰次

成無已注解

辨發汗吐下後脈證并治法第二十二

此第十卷第二十二篇凡四十八證前三陰三陽
篇中悉具載之

卷內音釋上卷已有

此已下諸方於隨卷本證下雖已有緣止以加減言之未甚明白似於覽者檢閱未便今復校勘備列於後
桂枝加葛根湯方

葛根

兩四

芍藥

兩二

甘草

兩二

生薑三兩切

大棗十二枚擘

桂枝二兩去皮

右陸味以水一斗先煮桂枝葛根減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆取微似汗不

須啜粥餘如桂枝湯法

桂枝加厚朴杏子湯方

於桂枝湯方內加厚朴二兩杏仁五十個去皮尖餘依前

法

桂枝加附子湯方

於桂枝湯方內加附子一枚炮去皮破八片餘依前法木附湯方附

於此方內去桂枝加白朮四兩依前法

桂枝去芍藥湯方

於桂枝湯方內去芍藥餘依前法

桂枝去芍藥加附子湯方

於桂枝湯方內去芍藥加附子一枚炮去皮破八片

餘依
前法

桂枝麻黃各半湯方

桂枝

一兩十六銖去皮

芍藥

生薑

切

甘草

炙

麻黃

各一兩去節

大棗

四枚擘

杏仁

二十四個湯浸去皮尖及兩仁者

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取一升八合去滓溫服六合

桂枝二麻黃一湯方

桂枝

一兩十七銖去皮

芍藥

一兩六銖

麻黃

十六銖去節

生薑

一兩六銖切

杏仁

十六個去皮尖

甘草

一兩二銖炙

大棗

五枚

右七味以水五升先煮麻黃一二沸去上沫內諸

藥煮取二升去滓溫服一升日再

白虎加人參湯方

於白虎湯內加人參三兩餘依白虎湯法

桂枝去桂加茯苓白朮湯方

於桂枝湯內去桂枝加茯苓白朮各三兩餘依

前法煎服小便利則愈

已上九方病證並在第二卷內

葛根加半夏湯方

於葛根湯方內加入半夏半升餘依葛根湯法

桂枝加芍藥生薑人參新加湯方

於第二卷桂枝湯方內更加芍藥生

薑各一兩人參三兩餘依桂枝湯法服

梔子甘草豉湯方

梔子豉湯方內加入甘草二兩餘依前法得吐止後服

梔子生薑豉湯方

梔子豉湯方內加生薑五兩餘依前法得吐止後服

柴胡加芒硝湯方

小柴胡湯內加芒硝六兩餘依前法服不解更服

桂枝加桂湯方

第二卷桂枝湯方內更加桂二兩其五兩餘依前法

已上六方病證並在第三卷內

柴胡桂枝湯方

桂枝去皮

黃芩

人參

各一兩半

甘草炙一兩

半夏

二合半

芍藥

一兩半

大棗六枚

生薑

一兩半切

柴胡

四兩

右九味以水七升煮取三升去滓溫服

附子瀉心湯方

大黃

二兩

黃連

黃芩

各一兩

附子

一枚炮去皮破別煮取汁

右四味切三味以麻沸湯二升漬之須臾絞去滓

內附子汁分溫再服

生薑瀉心湯方

生薑

四兩切

甘草

三兩炙

人參

三兩

乾薑

一兩

黃芩

三兩

半夏

半升洗

黃連

一兩

大棗

十二枚擘

右八味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升溫

服一升日三服

甘草瀉心湯方

甘草

四兩

黃芩

三兩

乾薑

三兩

半夏

半升洗

大棗

十二枚擘

黃連

一兩

右六味以水一斗煮取六升去滓再煎取三升温

服一升日三服

黃芩加半夏生薑湯方

於黃芩湯方內加半夏半升生薑一兩半餘依黃芩湯法

服

已上五方病證並在第四卷內

桂枝加大黃湯方

桂枝

三兩去皮

大黃

一兩

芍藥

六兩

生薑

三兩切

甘草

二兩炙

大棗

十二枚擘

右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升日三

服

桂枝加芍藥湯方

於第二卷桂枝湯方內更加芍藥三兩通前共六兩餘依桂枝湯法

四逆加吳茱萸生薑湯方

當歸

二兩

芍藥

三兩

甘草

二兩炙

通草

二兩

桂枝

三兩去皮

細辛

三兩

生薑

半斤切

吳茱萸

二升

大棗

二十五枚擘

右九味以水六升清酒六升和煮取五升去滓溫

分五服一方水酒各四升

已上三方病證並在第六卷內

四逆加人參湯方

於四逆湯方內加人參二兩餘依四逆湯法服

四逆加猪膽汁湯方

於四逆湯方內加入猪膽汁半合餘依前法服如無猪膽以羊

膽代之

已上二方病證並在第七卷內

注解傷寒論卷第十終