

Решение №1737

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о наличии (отсутствии) запрещённой информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

13 апреля 2013 г.
10 час. 00 мин.

г. Москва

Заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Кузькин Борис Петрович, рассмотрев информацию и (или) материалы, размещенные в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8> с учетом выводов комиссии Роспотребнадзора по оценке материалов и (или) информации о способах совершения самоубийства, а также призывов к совершению самоубийства

установил:

ссылка

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8> на

страницу Интернет-энциклопедии «Википедия», на которой размещена энциклопедическая статья под названием «Самоубийство», в которой приведена следующая информация: определение самоубийства (суицида), причины, факторы риска совершения самоубийств, меры профилактики суицидов, отношение к самоубийству в различных религиях, законодательная ответственность за самоубийство в России и зарубежных странах, приведены имена и изображения известных самоубийц древности, примеры массовых самоубийств. В разделе «Совершение самоубийства. Разновидности самоубийства» перечислены варианты осуществления суицида, при этом некоторые из них содержат подробную информацию о конкретной практике данного вида самоубийства, в частности: «Падение с высоты (прыжок с высоких зданий, скал, мостов и других возвышений). Химическое воздействие: Поглощение сильной щёлочи или кислоты. Самоубийство методом доведения себя до физического истощения (голодом или жаждой). Прыжок под поезд, под машину». Материалы данной страницы содержат детализированную информацию о способах самоубийства.

В связи с выше изложенным, данный раздел статьи под названием «Разновидности самоубийства» в Интернет-энциклопедии «Википедия» требует корректировки.

Решил:

Страница

<https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B4#.D0.A0.D0.B0.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.BD.D0.BE.D1.81.D1.82.D0.B8>

содержит запрещенную к распространению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию.





Статья Обсуждение

Читая Правка История

- Заглавная страница
- Рубрикация
- Указатель А — Я
- Избранные статьи
- Случайная статья
- Текущие события
- Участие
 - Сообщить об ошибке
 - Портал сообщества
 - Форум
 - Свежие правки
 - Новые страницы
 - Справка
 - Помоществование
- Печать/экспорт
- Инструменты
- На других языках
 - Afrikaans
 - Aragonés
 - العربية
 - Azerbaycanca
 - Boarisch
 - Žemaitėška
 - Bikol Central
 - Беларуская
 - Беларуская (тарашкевіца)
 - Български
 -
 -
 - Bosanski
 - Català

Самоубийство

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

[править]

Самоубийство **суицид** (от лат. *suus caedere* — убивать себя) — целенаправленное лишение себя жизни, как правило, добровольное (хотя бывают и случаи вынужденного самоубийства, см. Сенека) и самостоятельное. Чрезвычайно сложный этический вопрос представляет в этом смысле затаназия. Самопожертвование (например на войне и в других экстремальных ситуациях) принято отличать от самоубийства или считать «альтруистическим самоубийством». «Самоубийство бога» (Один, Атис) — один из четырёх основных (архетипических) сюжетов. 10 сентября провозглашён ВОЗ Всемирным днем предотвращения самоубийств.^[2]

Содержание


- 1 Определения
- 2 Причины самоубийств
 - 2.1 Факторы риска
 - 2.1.1 Социальные
 - 2.1.2 Медицинские
 - 2.2 Защитные (антисуицидальные) факторы личности
 - 2.3 Подростковые самоубийства
 - 2.4 Профилактические меры
- 3 Совершение самоубийства
 - 3.1 Подготовка
 - 3.2 Разновидности
- 4 Религия и самоубийство
- 5 Самоубийство и закон
- 6 Самоубийство и психиатрия
- 7 Массовые самоубийства
- 8 Известные самоубийцы древности
- 9 Самоубийства в животном мире
- 10 См. также
- 11 Примечания
- 12 Литература
- 13 Ссылки

Определения

[править]

Причинение смерти

- Убийство
 - Заказное убийство
 - Массовое убийство
 - Детубийство
 - Отцеубийство
 - Причинение смерти по неосторожности
 - Геноцид • Суд Линча
 - Убийство чести
 - Ритуальное убийство
 - Цареубийство
- Убийца
 - Насильный убийца
 - Серийный убийца
 - Ассасин
- Криминальное причинение смерти
 - Доведения до самоубийства
- Некриминальное причинение смерти
 - Смертная казнь
 - Звтаназия
 - Самоубийство
- Проект Право • Портал Право



Интернет

Самобийство — Википедия - Windows Internet Explorer предоставлен Яндекс

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%92%D0%9A%D0%94%D0%9C%D0%9E%D1%81%D1%83%D0%B9

Google Поиск Поделиться Дополнительно Войти

Избранное https://sistema.zapret-info... W Самобийство — Викип... Домой Веб-каналы (1) Читать почту Печать Страница Безопасность Сервис

Определения [править]

Все самоубийства можно условно разделить на два класса — *истинные* и *демонстративные* (так называемый *парасуицид* или *псевдосуицид*). Как правило, псевдосуицид совершается в состоянии аффекта и является не столько попыткой лишить себя жизни, сколько «криком о помощи» — попыткой обратить на себя и свои проблемы внимание окружающих. Эти действия также называют «демонстративной попыткой суицида». В противовес псевдосуициду, *истинный суицид* — это, как правило, хорошо спланированное мероприятие, цель которого — любой ценой лишить себя жизни вне зависимости от мнения и реакции родных, близких, друзей и т. д. Иногда ^[источник не указан] несамостоятельное лишение себя жизни тоже считается самоубийством, особенно если самоубийца был физически не в состоянии сделать это.

Поведение, обычно не приводящее к немедленной смерти, но являющееся опасным и/или сокращающее жизнь (пьянство, курение, отказ от медицинской помощи при серьезных заболеваниях, нарочитое пренебрежение ПДД или техникой безопасности, экстремальный спорт без надлежащей тренировки и экипировки, пренебрежение опасностью во время боевых действий), при том, что совершающий понимает его опасность, но возможный риск ему безразличен, называется *саморазрушающим поведением*. Некоторыми исследователями такое поведение выделяется в третий класс самоубийств — *скрытый суицид*.

Попытка убить себя, которая не удалась, называется *попыткой самоубийства*. Попытка самоубийства называется *серьезной*, если она могла привести к смерти с большой вероятностью. Попытки суицида, в зависимости от выбранного способа самоубийства, способны повредить здоровью человека, совершившего этот акт.

Неудавшиеся самоубийцы склонны доводить начатое до конца.

Препятствием для совершения суицида могут являться *антисуицидальные факторы личности*, обесценивающие самоубийство как способ разрешения проблем и формирующие *антисуицидальный барьер*. Как правило, такими факторами являются нереализованные творческие планы, осознание бессмысленности самоубийства, боязнь причинить душевную боль родным и близким, неуверенность в надёжности выбранного способа самоубийства, а также религиозные и социальные табу, связанные с проблемой смерти и самоубийства. Для некоторых личностей сам акт самоубийства как символ (или просто как неудавшийся акт) может быть символом слабости.

Причины самоубийств [править]

Среди причин самоубийств можно назвать следующие:

- Проблемы в личной жизни
 - тотальный неуспех в романтических или сексуальных отношениях;
 - несчастливая любовь;
 - смерть кого-то из родных или друзей;
 - непонимание окружающими, одиночество;
 - проблемы на работе, финансовые проблемы;
 - аутинг (*публичное разглашение личной информации о сексуальной ориентации или гендерной идентичности человека против его желания и согласия*);
 - проблемы со здоровьем;
 - тяжелая депрессия (по сводкам ВОЗ до 15 % депрессий завершаются самоубийством^[2]);
- Доведение до самоубийства
 - целенаправленная травля, клевета, угрозы, унижения;
 - физические издевательства, изнасилования, побои;
- Потеря интереса к жизни, усталость от жизни, потеря смысла жизни;
- Религиозный фанатизм (обычно распространённый в сектах), ритуальное самоубийство.
- Идеологические (политические) — неприятие ценностей социума в целом)
- Вынужденное самоубийство (по приговору суда, под угрозой мучительной смерти или расправы с близкими родственниками, см. Сенека, Роммель)
- Боязнь наказания (страх осуждения со стороны родных или общества у разоблаченных преступников).
- Самоубийство для сохранения чести (характерно)

Интернет

Самоубийство — Википедия — Windows Internet Explorer предоставлен Яндекс

W https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%87%D0%83%D1%86%D0%84%D0%A0.D0.B9.D0.B7.D0.BD.D0.BE.D0.B2.D0.B8.D0.B4.D0.B7.D0.BE.D1.B1.D1.3C.D0.B6

Go g le Поиск Поделиться Дополнительно Войти

Избранное https://sistema.zapret-info... W Самоубийство — Викип... X Домой Веб-каналы (1) Читать почту Печать Страница Безопасность Сервис

• Влияние одиночного заключения в отдельных случаях

Факторы риска [править]

Примерно половина самоубийц совершали перед этим хотя бы одну *суицидальную попытку*, а после такой попытки 1 человек из 100 совершают самоубийство в течение года, что означает стократное повышение риска самоубийства^[6].

Социальные [править]

Молодые люди и подростки совершают самоубийство чаще взрослых^[8], мужчины в 4 раза чаще женщин (хотя женщины совершают в 4 раза больше попыток самоубийства)^[7]. У безработных, а также у неквалифицированных работников склонность к самоубийству повышена. Врачи, в особенности женщины, также подвержены повышенному риску: метаанализ 25 источников показал, что женщины-врачи совершают в 2,3 раза больше самоубийств, чем в среднем по популяции, а мужчины — в 1,4 раза^[6].

Те, кто никогда не состоял в браке, чаще всего совершают самоубийства. Далее в порядке снижения риска следуют овдовевшие, разведённые и женатые, но не имеющие детей. Проживание в одиночестве также увеличивает риск. Повышают риск самоубийства и неурядицы в семье^{[9][10]}.

Плохое обращение и другие виды негативного опыта в детстве увеличивают склонность к суициду во взрослом возрасте, по меньшей мере, через такие промежуточные факторы, тесно связанные с негативными переживаниями в детстве, как злоупотребление алкоголем и наркотиками, а также склонность к депрессии^{[10][11]}.

Медицинские [править]

Заболевания, в особенности сопровождающиеся хроническими болями, хронические заболевания вообще, а также недавно перенесенные хирургические вмешательства повышают риск самоубийства^[12]. Следует отметить, что ВИЧ-инфекция, как таковая, не увеличивает риска^[12].

Наличие близких родственников, совершивших суицид, увеличивает риск в шесть раз. Наследственный фактор суицида составляет от 30 до 50 % (но не выяснено, что является основной причиной этого — генетические причины (включая наследование психических заболеваний) либо сам факт самоубийства близких родственников)^[12].

Психические заболевания

При большой депрессии вероятность самоубийства увеличивается в 20 раз по сравнению со среднестатистической вероятностью для общей группы^[13]. Около 60 % самоубийц страдали этим заболеванием, при котором вероятность осуществления самоубийства составляет 8 %^[13]. Коморбидные расстройства увеличивают этот риск, так при сопутствующем паническом расстройстве эта вероятность повышается до 25 %, а при ПТСР — до 38 %^[13]. Вообще, при сочетании нескольких психических заболеваний риск самоубийства выше, чем при неосложнённой депрессии или тревожном расстройстве^{[15][16]}. Наиболее опасными заболеваниями с точки зрения суицидального риска являются депрессии, биполярные расстройства, алкоголизм и другие наркомании, шизофрения, тревожные (включая паническое) и личностные расстройства, ПТСР и делирий^{[17][18][19]}.

От 20 до 25 % самоубийств совершаются в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения^[19].

Импульсивность увеличивает вероятность *реализации* суицидальных мыслей, при этом сочетание импульсивности, алкоголизма (либо наркотической зависимости) и отчаяния особенно опасно^[19]. Такая комбинация наиболее часто встречается у подростков.

Защитные (антисуицидальные) факторы личности [править]

Прочные семейные и социальные связи снижают вероятность суицида^[19]. Наличие детей, особенно для женщин, а также беременность являются сильными факторами снижения риска^[20]. Религиозные убеждения и, в особенности, участие в религиозной деятельности, пиперответственность, наличие творческих планов, а также боязнь физического страдания часто снижают вероятность совершения акта самоубийства^[19].

Подростковые самоубийства [править]

Причиной подростковых самоубийств чаще всего являются бедность, отношения в семье и со сверстниками, алкоголь и наркотики, неприятности с учёбой, неразделённая любовь, пережитое в детстве насилие, социальная изоляция, неизлечимые болезни^[21].

Повышенный риск самоубийства имеют гомосексуальные подростки, которые совершают попытки суицида от двух до шести раз чаще своих гетеросексуальных сверстников^[22].

Профилактические меры

Ранняя идентификация и соответствующее лечение расстройств психики — важная часть стратегии профилактики. Основными критериями лечения и профилактики самоубийств — является формирование антисуицидальн

Интернет